



# FRUITFOG<sup>®</sup> -M/I

## BOTE FUMÍGENO FUNGICIDA PARA TRATAMIENTO POSTCOSECHA DE PERAS Y MANZANAS

### Utilidad:

Bote fumígeno fungicida a base de METILTIOFANATO e IMAZALIL para tratamiento postcosecha de manzanas y peras en cámaras de conservación. Controla los principales hongos causantes de podredumbres en fruta de pepita: *Penicillium spp*, *Gloesporium spp*,...etc.

### Composición:

METILTIOFANATO ..... 12.0% p/p  
IMAZALIL..... 10.0% p/p

### Propiedades:

Aspecto: Polvo esponjoso de color blanco grisáceo  
Olor: Característico  
Densidad aparente (Kg/L): 0.582 – 0.682

### Modo de empleo y dosis:

Modo de empleo: Determinar la cantidad de fruta a tratar y utilizar el número de botes de FRUITFOG-M/I necesario según la dosis recomendada. Retirar el tapón verde de la parte superior del bote y a continuación encender la mecha. Cerrar el local herméticamente y mantenerlo cerrado durante al menos 24 horas. Una vez abierto se debe dejar airear el local al menos 2 horas antes de entrar en el mismo.

### Dosis:

24 g/Tm de fruta (equivalente a 1 bote de 600 g de fumígeno por cada 25 Tm de fruta a tratar).

*No dejar el bote cerca de materiales inflamables*

Cuando así lo exija la legislación vigente en los países de destino, en los envases en los que se expida la fruta tratada, deberá incluirse una etiqueta con el texto: "Tratamiento fungicida con Metiltiofanato e Imazalil"

### Presentación:

Botes metálicos. Contenido neto: 600 gramos de fumígeno  
*Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con el nº 21208.*

Fecha de revisión: 11/2014

